δ. R. *Rubiginosa semiplena*. Du Pont, Choix des Roses, etc. p. 3.
R. (*Eglanteria*) *flore pleno*. Andr. R. fig. Vulg. *la Petite hessoise*.
ε. R. *Rubiginosa flore multiplici*. Andr. R. fig. Très-double.
ζ. R. *Rubiginosa marmorea*. Ait. *Kew*. 2, *pag*. 207. ε. Andr. R. fig. Semi-double, à pétales roses rayés de nervures fines et brunes.
η. R. *Rubiginosa muscosa*. Andr. R. fig. vulg. l'*Églantine mousseuse*. Calices couverts d'un duvet assez long, mais qui n'a aucun rapport avec les poils visqueux de nos Roses mousseuses. Les Anglais l'appellent *Manning's rose*, du nom du jardinier qui l'a obtenue.
θ. R. *Rubiginosa major*. R. (*eglanteria*) *major*. And. R. fig. Ce Rosier est remarquable par l'élévation de ses tiges et la grande dimension de ses feuilles. Semi-double.

** *Tubes des calices glabres, pédoncules hispides.*

ι. R. *Rubiginosa vera*. Desv. *l. c.* p. 118, var. δ. *Excl. syn.* Linné.
R. (*Eglanteria.*) And. R. fig. Vulg. l'*Églantier sauvage*.
κ. R. *Rubiginosa triflora*, *germinibus glabris flor.* 2, 3, 4, *vel.* 5, *terminalibus*. Willd. *l. c.* var. β.
R. *Rubiginosa dubia*. Desv. *l. c.* v. ξ. R. *Rubiginosa*. Merat, Fl. de Paris, v. B.
λ. R. *Rubiginosa tenuiglandulosa*. *R.* (*tenuiglandulosa.*) Merat. *l. c.* p. 189.
R. *Rubiginosa fallax*. Desv. *l. c.* var. α. Fleurs très-petites, souvent solitaires.
μ. R. *Rubiginosa microcarpa*. Desv. *l. c.* var. β.
ν. R. *Rubiginosa rotundifolia*. Rau, *En. Ros.* pag. 136, *var.* δ. Fleurs solitaires, folioles presque rondes, petites, de la longueur des aiguillons. L'Allemagne.

*** *Tubes des calices et pédoncules glabres.*

. R. *Rubiginosa* Isaureæ, *germinibus subglobosis pedunculisque glabris; foliolis subrotundis, utrinque glandulosis serratis; serraturis iterum serratis glandulis terminatis; petiolis aculeatis; aculeis ramulorum turionumque substipularibus; floribus solitariis*. (N.) L'Églantine de *Clémence* Isaure.
R. (*Sabina.*) Du Pont, Cat. inédit, série 11. Ce Rosier offre un arbrisseau de la hauteur d'un pied et demi au plus, rameux, étalé. Pédoncules uniflores, très-courts; rarement quelques soies sur les tubes des calices. Fleurs simples. Se trouve, selon M. Du Pont, dans les îles de la Grèce avec le *Cretica*.
ο. R. *Rubiginosa glabra*. Rau, *l. c.* p. 137.
R. *Rubiginosa inermis?* Desv. *l. c.* var. θ.
π. R. *Rubiginosa Zabeth*. Du Pont, Choix des Roses, etc. p. 3.
R. *germinibus globosis pedunculisque glabris; foliolis ovatis subtus et margine resinoso-glandulosis; petiolis villosis cauleque aculeatis; floribus rubris semiplenis*, 2—4, *corymbosis*. (N.) L'Églantine de la *Reine* Élisabeth.

Le nom *Zabeth* est ici par abréviation de celui d'Elizabeth, reine d'Angleterre, à laquelle cette Rose a été dédiée. Il est à croire que c'est l'huile essentielle de notre variété qui entrait dans la préparation d'un extrait que cette princesse composait elle-même, et dont elle donna le secret à l'empereur Rodolphe II. Voici ce que Rosenberg dit des vertus de ce médicament (*Rhodologia*, p. 259). « *Caput... cor et alias humani corporis partes... mirè roborat,* « *spiritus recreat, memoriam firmat, vim procreandi insigniter promouet*, etc.

Le Rosier Rouillé a des rapports avec le Rosier des Haies (*Sæpium*); mais ce dernier diffère du premier, 1° par ses tiges très-élevées, munies d'aiguillons plus nombreux, et plus rapprochés; 2° par ses folioles inodores, allongées, écartées, aiguës à la base et au sommet; 3° et enfin par ses styles presque toujours glabres et divergents.

